

Mordeduras y picaduras

Consecuencias de la mordedura

- La infección (tétanos).
- La rabia: Enfermedad mortal debida a un virus que se presenta en la saliva del animal enfermo, y que se transmite al hombre por contacto directo (mordedura, arañazo, o saliva depositada sobre una herida).

Tratamiento general de la mordedura

- Limpieza meticulosa de la herida con agua y jabón.
- Cohibir la hemorragia (en su caso).
- Cubrir la herida con un apósito estéril.
- Traslado obligatorio a un centro sanitario para profilaxis antitetánica y vacunación antirrábica (en caso necesario).
- Si es posible, hay que comprobar si el animal que ha mordido está contaminado por el virus, capturándolo y llevándolo a un veterinario.
- TELÉFONO TOXICOLOGÍA: 915 620 420

Animales Domésticos o Salvajes

- Tétanos.
- Rabia.
- Estas heridas se infectan fácilmente debido a la abundancia de restos alimenticios y gérmenes en la boca del animal.

Tratamiento de Animales Domésticos o Salvajes

- Limpieza meticulosa de la herida con agua y jabón.
- Contener la hemorragia si la hubiera.
- Cubrir la herida con un apósito estéril.
- Traslado obligatorio para prevención antirrábica si hubiera.
- Si es posible hay que comprobar que el animal que ha mordido está contaminado por el virus, capturarlo y llevarlo a un veterinario para que lo tenga en observación.

Picadura de insecto

- Generalmente son leves, produciendo inflamación, enrojecimiento y prurito en la zona afectada; puede revestir gravedad si:
 - Son múltiples.
 - Afectan a la cavidad oral y/o garganta (provocarán problemas respiratorios).
 - La persona es hipersensible (shock anafiláctico).

Tratamiento de la picadura de insecto

- Aplicar una compresa encima de la picadura con: amoníaco rebajado, vinagre o hielo.
- En el caso de picadura en el interior de la boca, hacer chupar hielo durante el traslado urgente al centro asistencial.
- Vigilar las posibles alteraciones de las constantes vitales en los casos graves.
- NO quitar los aguijones que aún tienen prendida la vesícula venenosa, si se desconoce la maniobra apropiada.

Picadura de araña

- Las más peligrosas son:
- Viuda negra.
- Tarántula.
- Pollera o polla.



Picadura de araña

- La víctima generalmente no siente la picadura; algunas veces se observan dos puntos rojos en el lugar de la picadura.
- Dolor local intenso, durante las dos primeras horas.
- Calambres en el miembro afectado que puede irradiarse a los músculos de la espalda.
- Rigidez abdominal producida por el dolor.
- Dificultad para respirar.
- Náuseas y vómito, sudoración abundante, shock.

Tratamiento de la Picadura de araña

- Lave la herida.
- Aplique compresas frías.
- Atienda el shock y traslade la víctima rápidamente a un centro asistencial.

Picadura de mosca


- La miasis es la infección de órganos y tejidos por larvas de moscas, la cual produce varios días después, diversas manifestaciones según el sitio afectado, áreas expuestas de la piel y raramente en ojos, oídos y nariz.
- Enrojecimiento e inflamación.
- Secreción purulenta fiebre y dolor.
- Incomodidad y pérdida de la función de la parte afectada.

Tratamiento de la picadura de mosca

- Taponar el orificio de la lesión con aceite mineral, glicerina o vaselina para facilitar la extracción de las larvas.
- Retírelas una vez que se hayan desprendido, con la ayuda de unas pinzas. Si no tiene pinzas utilice guantes o un trozo de plástico para proteger sus dedos. Se recomienda no puncionar o romperlas dentro de la lesión porque se puede producir infección bacteriana.
- Lave frotando la piel con agua y jabón, para remover los gérmenes que hayan quedado en la herida.
- No es recomendable que se use calor ni cigarrillo encendido porque lesionan la piel y no garantizan que las larvas se desprendan completamente.
- Traslade al centro asistencial, si no puede quitarlas, si parte de ellas permanecen en la piel, si se desarrolla una erupción o síntoma de gripa.

Víboras o serpientes

- Se caracteriza:
- 2 puntos rojos, separados entre sí por 1 cm. aproximadamente, dolorosos, por los que se inocua el veneno.
- Inflamación local progresiva.
- Amaratamiento de la piel.
- Media hora más tarde, se altera el estado general: malestar, sudoración, dolor de cabeza.



Tratamiento de la mordedura de víbora o serpiente

- Colocar una ligadura (entre la herida y el corazón) que impida únicamente el retorno venoso (compresor venoso).
- Mantener en reposo la zona afectada.
- Desinfectar la herida y aplicar frío local (hielo).
- Traslado urgente para la inyección de suero antiofidio (antes de 1 hora).
- NO efectuar incisiones en la herida.
- NO succionar el veneno.

Picadura de escorpión

- No suele ser grave en adultos pero sí en niños pequeños. Esta picadura se caracteriza por:
- Causa un dolor muy intenso en el punto afectado.
- Seguidamente produce hinchazón reducida alrededor de la picadura.
- Poco después se presenta un trastorno general con temblores, vértigos, dolor de cabeza, sudoración, hipo y alteraciones respiratorias.

Tratamiento picadura de escorpión

- Si se trata de una extremidad, se colocará un torniquete cerca de la zona afectada, aflojándolo cada 10 minutos.
- Se pondrán compresas muy frías sobre la picadura.
- No hay que dar a la víctima estimulantes ni tampoco ninguna bebida alcohólica.
- Procurar lo antes posible asistencia médica.

Tratamiento para garrapatas y sanguijuelas

- Las garrapatas y sanguijuelas hay que desprenderlas con sumo cuidado ya que podría quedarse prendida la cabeza y originaría infecciones graves.
- En el caso de las garrapatas, si ya está fuertemente adherida, trate de desprenderla echándole unas gotas de trementina o tocándola con una aguja caliente o la punta de un cigarrillo encendido.

Tratamiento para garrapatas y sanguijuelas

- Si aún así se mantiene prendida, no trate de separarla tirando de ella. Cúbrala con aceite, vaselina o cualquier otra pomada, impidiendo así la respiración del insecto; al cabo de media hora suele desprenderse.
- Si tampoco este método diera resultado, coja la garrapata con unas pinzas (nunca la toque con los dedos), tirando de ella lenta y suavemente para no aplastarla y lograr que se desprenda totalmente la cabeza.

Tratamiento para garrapatas y sanguijuelas

- Lave después, abundantemente, la región afectada, frotando con agua y jabón. Las garrapatas pueden transmitir diversas infecciones, pero generalmente esto no ocurre si no han permanecido adheridas mucho tiempo. Si la picadura se inflamara o produjera fiebre, o la garrapata estuviera incrustada en la piel, acuda a un centro asistencial.

Animales marinos

- Estas lesiones raramente son graves. Por lo general provocan lesiones locales dolorosas debido a su acción urticante por contacto (medusas, anémonas), a sus espinas (erizo de mar) o a su picadura (raya, araña de mar). Estas últimas pueden provocar alteraciones generales.
- **TRATAMIENTO:**
 - Limpieza del área afectada con agua y jabón.
 - Calmar el dolor, aplicando compresas de amoníaco rebajado, vinagre o introduciendo la zona afectada en agua caliente.

Medusas

- Los síntomas comunes a las picaduras de medusas, son:
 - Dolor.
 - Ardor.
 - Inflamación.
 - Enrojecimiento.
 - Sangrado.

Tratamiento picadura de medusa

- Lo primero que hay que hacer es limpiar la zona afectada por la picadura.
- Nunca deberemos usar agua dulce, ya que podrá romper las células urticantes, sufriendo otra picadura.
- Para limpiar la zona, el suero fisiológico es perfecto.
- El agua salada también podrá ser una solución.
- Durante 15 minutos aproximadamente deberemos aplicar frío a la zona afectada.
- Si hay algún resto de tentáculo adherido a nuestra piel, debemos quitarlo, pero nunca con las manos. Utilizaremos unas pinzas.
- También se administrará un antihistamínico, para la reacción y un analgésico para el dolor.
- Si el dolor es muy intenso o el estado de la víctima empeora, deberá acudir a un centro médico de inmediato.
- No hay que frotarse ni con toallas, ni con arena, ni con nada que pueda lastimarnos más.

Plantas urticantes

- El contacto con las plantas urticantes puede provocar sobre la piel una reacción local con irritación, ardor y picor.
- **TRATAMIENTO:**
 - No rascar ni frotar la zona afectada.
 - Enfríe la zona con agua o aplique amoniaco sobre la zona afectada